

第2类医药品

杀菌消毒药 新キズドライ

特记事项

- (1) 使用本药之前请使用自来水等干净的水充分清洗患部（如果在没有充分清洗的状态下使用，患部会残留污物，有可能导致化脓）
- (2) 伤口范围大，伤口较深，烫伤等情况请勿使用本药
- (3) 请勿反复涂抹本药
- (4) 反复在同一部位使用时，请用温水将患部冲洗干净，去除附着在患部的药剂后再使用（药剂有可能难以清除，导致延误治愈）

使用方法

①伤口上附着有泥土等污物时，请将自来水龙头开到最大，充分冲洗伤口上的污物	②如果出血量较多，请用纸巾轻轻擦拭	③使用前请充分摇晃，在距离伤口10cm左右处，以正立或倒立的状态使用
--------------------------------------	-------------------	------------------------------------

使用注意事项

禁止事项

（如不遵守，将导致当前症状恶化或易引起不良反应）

1. 下列人群请勿使用

- (1) 患部范围大，伤口深、出血多，烫伤的人（有可能因无法充分清洗伤口，导致伤口化脓，耽误治疗）
- (2) 两岁以下的婴幼儿（因皮肤组织尚未发育成熟，可能会引起发红等炎症）

2. 请勿用于下列部位

- (1) 面部
- (2) 粘膜（例如：眼睛、口唇、口腔、鼻孔、耳内、肛门、性器官等）

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 对药物、化妆品、明胶等有过敏史（例如：皮疹、发红、瘙痒、接触性皮炎等）的人

2. 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀、疼痛、热感

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转，请停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

割伤、擦伤、刺伤、抓伤、磨脚、创伤面的杀菌、消毒

用法、用量

请每天数次，适量喷于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 在患部及其周围不洁净时请勿使用
- (2) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (3) 请注意不要溅入眼睛及口腔内。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- (4) 本品仅限外用
- (5) 使用前请摇匀
- (6) 请在距患部 10cm 左右处进行喷涂
- (7) 使用后可能会出现冻伤，因此请不要对同一部位连续喷涂 1 秒以上

●仔细阅读“特记事项”中的各项内容

成分、含量

100 g 中

成分	含量
异丙基甲基苯酚	0.15g
盐酸地布卡因	0.045g
尿囊素	0.15g

辅料：苯扎氯铵、明胶、玉米淀粉、白糖、角鲨烷、LPG

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉场所
 - (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
 - (3) 请勿靠近火源
- 请勿放置在车内、阳光直射的场所以及供暖器具（暖炉、暖风机等）附近，否则有温度上升造成破裂的危险

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>