

第 2 類醫藥品

殺菌消毒藥 新キズドライ

特記事項

- (1) 使用本劑之前請使用自來水等乾淨的水充分沖洗患部髒汙（如果在沒有充分沖洗的狀態下使用，有可能患部會殘留髒汙，導致化膿）
- (2) 受傷範圍大，傷口較深，燙傷等情況不可使用本劑
- (3) 請勿重複塗抹本劑
- (4) 反覆在同一部位使用時，請用溫水將患部沖洗乾淨，去除附著在患部的藥劑後，再行使用（有可能造成難以清除藥劑，導致延誤痊癒）

使用方法

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| ①傷口上附著有泥土等髒汙。請將自來水的水龍頭開到最大，徹底沖洗傷口上的髒汙 | ②如果出血量較多，請用面紙輕輕擦拭掉 | ③使用前請充分搖晃本罐，在距離傷口 10cm 左右處，以正立或倒立的狀態使用 |
|---------------------------------------|--------------------|--|

使用注意事項

禁止事項

（若不遵守，可能會使目前的症狀惡化，或容易產生副作用）

1. 下列人士不可使用

- (1) 患部範圍大者、傷口深、出血多者、燙傷者（有可能因無法徹底清洗，導致傷口化膿，延誤痊癒）
- (2) 2 歲以下的嬰幼兒（因皮膚組織尚未發育成熟，可能會引起發紅等發炎症狀）

2. 下列部位不可使用

- (1) 臉部
- (2) 黏膜（例如：眼睛、口唇、口腔、鼻孔、耳內、肛門、性器官等）

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 對藥物、化妝品、明膠等曾有過敏反應者（如，起疹、發紅、發癢、長疹子等）者

2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

| 相關部位 | 症狀 |
|------|--------------------|
| 皮膚 | 長疹子和發紅、發癢、腫脹、疼痛、熱感 |

偶有出現下列嚴重症狀的可能。一旦出現，請立即接受醫生的診療

| 症狀的名稱 | 症狀 |
|-------------|--|
| 休克 (過敏性) | 使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。 |

3.使用 5~6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

割傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨破腳、創傷面的殺菌、消毒

用法、用量

1 天數次，將適量本劑噴霧在患部

<用法、用量相關注意事項>

- (1) 請勿在患部及其周圍骯髒的情況下使用
- (2) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛及口腔內。萬一跑進眼睛時，請立即用水或者溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療。另外，跑進口腔時，請馬上漱口並接受醫生的診療
- (4) 本品僅限外用
- (5) 使用前充分搖晃
- (6) 在距離患部 10 cm 左右處噴射
- (7) 請勿在同一部位連續噴射 1 秒以上，有可能會凍傷

●仔細閱讀「特記事項」中的各項內容

成分、含量

100 g 中

| 成分 | 含量 |
|--------|--------|
| 異丙基甲基酚 | 0.15g |
| 鹽酸二丁卡因 | 0.045g |
| 尿囊素 | 0.15g |

添加物：苯扎氯銨、明膠、玉米澱粉、白糖、角鯊烷、LPG

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並保存於避免陽光直射的乾燥、陰涼處
 - (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
 - (3) 請避免接近火源
- 請勿於車內、陽光直射的場所或暖氣器具（暖爐、暖風扇等）等物品附近，以免因溫度上升而引起破裂的危險

銷售商 小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>