

## 第 2 類醫藥品

## 中藥製劑 コムレケア

販売名：コムレケア a

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 被診斷為以下疾病的人請勿服用：心臟病
2. 僅限於出現症狀時服用，請勿連續服用

## 諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生治療者
  - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - (3) 高齡者
  - (4) 有下列症狀者：水腫
  - (5) 接受過以下診斷的人:高血壓、腎病
2. 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

偶有出現以下嚴重症狀的可能。一旦出現，應立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍微活動過量時會出現呼吸急促、呼吸困難、乾咳、發燒等症狀，這些症狀突然出現，或持續不退
假性醛固酮增多症、肌病	出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬，進而出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重
充血性心衰竭、心室心搏過速	出現全身無力、心悸、呼吸急促、胸部不適、胸痛、眩暈、失神等症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀

3. 若服用 5~6 次後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

無論體力狀況如何皆可使用本劑，用於肌肉急劇痙攣伴隨疼痛的以下症狀：抽筋、肌肉痙攣、腹痛、腰痛

## 用法、用量

飯前或餐間用溫水或水服用，用量如下

年齡	單次劑量	服用次數
成人（15 歲以上）	4 錠	1 天 3 次
7 歲以上未滿 15 歲	2 錠	
未滿 7 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
  - (2) 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

## 成分、含量

每天用量（12 錠）中 芍藥甘草湯萃取物…… 2.4g

芍藥	6.0g
甘草	6.0g
中萃取	

添加物：CMC-Ca、二氧化矽、硬脂酸鎂、滑石、纖維素

- 由於本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥、涼爽之處
  - (2) 請保管在孩童拿不到的地方
  - (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
  - (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑
  - (5) 將 1 包分成幾次服用時，剩下的藥物請將袋口折好後存放
- 此外，存放的剩餘藥物請在當日內服用或丟棄

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>