

第2类医药品

外用消炎镇痛剂 コムレケア ヨコヨコ

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用
 - (1) 对本品或本品成分有过敏史的人
 - (2) 有哮喘病史的人
 - (3) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (4) 不满 15 岁的儿童
2. 请勿用于下列部位
 - (1) 眼部周围、粘膜等
 - (2) 湿疹、接触性皮炎、伤口
 - (3) 足癣、体癣等或化脓的患处
3. 不要长期连续使用

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 有药物过敏史的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀、刺痛感、接触性皮炎

极少数患者会引发以下严重症状, 此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

肌肉痛、扭伤、关节疼痛、腰痛、腱鞘炎 (手、手腕、脚踝的疼痛和肿胀)、肘痛 (网球肘等)、跌打损伤、肩膀僵硬伴随的肩部疼痛

用法、用量

1日2~4次，取适量涂于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- (2) 本品仅限外用
 - 不要用保鲜膜等透气性差的物品覆盖涂抹的部位
 - 皮肤特别敏感的人不要连续在同一部位使用
 - **如果刺激感强烈，用肥皂冲洗可以缓解**

成分、含量

100g 中

成分	含量
联苯乙酸	3g
醋酸生育酚酯	0.5g
1-薄荷醇	6g

辅料：二异丙醇胺、己二酸二异丙酯、肉豆蔻酸异丙酯、BHT、丙二醇、硫酸镁、乙醇

保管及使用注意事项

- (1) 请将盖子盖紧，直立存放在避免阳光直射，低湿度的阴凉处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿使用过期产品。另外，即使在使用期限之内，开封后也请尽快使用
- (5) 请勿靠近火源
 - 请拧紧瓶盖，以防液体渗漏
 - 液体接触到塑料制品（眼镜框、梳子、马桶座圈等）、化纤衣物、木材（涂有涂料的家具、地板等）和皮革等会导致损伤，或者产生污渍，敬请注意
 - 如果沾染到衣物上，请尽快按照各衣物的洗涤标识进行清洗

严禁火源

第一石油类 危险等级II 乙醇含有物

销售商：小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页：<https://www.kobayashi.co.jp>