第 2 類醫藥品

外用鎮痛消炎劑　コムレケア ヨコヨコ

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士禁用
   (1) 曾因本劑或本劑成分產生過敏反應者
   (2) 曾經出現過哮喘者
   (3) 懷有身孕或有可能懷孕的婦女
   (4) 不滿 15 歲的兒童
2. 請勿用於以下部位
   (1) 眼部周圍、黏膜等
   (2) 濕疹、接觸性皮膚炎、傷口
   (3) 足癬、體癬等或化膿的患部
3. 請勿長期連續使用

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
   (1) 正在接受醫生治療者
   (2) 有藥物過敏史者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、火辣感覺、接觸性皮膚炎

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
休克（過敏性）	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀

3. 如使用 5～6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

肌肉痛、扭傷、關節疼痛、腰痛、腱鞘炎（手、手腕、腳踝的疼痛和腫脹）、肘痛（網球肘等）、跌打損傷、肩膀僵硬伴隨的肩膀疼痛

用法、用量

1 天 2～4 次，取適量本劑塗抹於患部

<用法與用量的注意事項>

(1) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或者溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療

(2) 本品僅限外用

- 請勿以保鮮膜等透氣性差的物品覆蓋塗抹部位
- 皮膚特別脆弱者，請勿持續用於相同處
- **若刺痛的刺激強烈，以肥皂清洗，就會緩和**

成分、含量

100g 中

成分	含量
聯苯乙酸	3g
醋酸鹽維生素 E	0.5g
l-薄荷醇	6g

添加物：二異丙醇胺、己二酸二異丙酯、肉豆蔻酸異丙酯、BHT、丙二醇、硫酸鎂、乙醇

保管與使用相關注意事項

(1) 請蓋緊蓋子，直立保存於不會直曬陽光，濕度低的陰涼處

(2) 請存放在幼兒拿不到的地方

(3) 請勿換裝到其他容器中 (可能造成誤用或者變質)

(4) 請勿使用過期的產品。此外，即使在使用期限內，開封後請儘快使用

(5) 請不要靠近火源

- 請轉緊瓶蓋，以防液體外漏
- 液體沾到塑膠產品（鏡框、梳子、便座等）、化纖衣物、木材（塗有塗料的家具、地板等） 、皮革等，可能損耗，或者產生污漬，敬請注意
- 如果附著在衣物上，請迅速按照各衣物的洗滌標識進行清洗

嚴禁火源

第一石油類　危險等級Ⅱ　乙醇含有物

銷售商 ： 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 ：https://www.kobayashi.co.jp

中国語 (繁体中文)　2024.10 作成

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之説明文件。