

第 2 類醫藥品

外用抗炎鎮痛藥

コムレケア ヨコヨコ

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士請勿使用
 - (1) 對本劑或本劑成分曾有過敏反應者
 - (2) 曾經出現過哮喘者
 - (3) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (4) 不滿 15 歲的兒童
2. 請勿用於以下部位
 - (1) 眼部周圍、黏膜等部位
 - (2) 濕疹、接觸性皮炎、傷口或化膿的患部

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 對藥物曾有過敏反應者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、火辣感、接觸性皮炎

偶有出現以下嚴重症狀的可能。一旦出現，應立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
休克（過敏性）	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

3. 如使用 5~6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

肌肉痛、扭傷、關節疼痛、腰痛、腱鞘炎（手、手腕、腳踝的疼痛和腫脹）、肘痛（網球肘等）、瘀傷、伴隨肩頸酸痛的肩痛

用法、用量

1天2~4次，取適量本劑塗抹於患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。若不慎跑進眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重，請立刻至眼科就醫
- (2) 本劑僅限外用
 - 塗抹部位請勿用保鮮膜等透氣性差的東西覆蓋。
 - 皮膚較脆弱的人請勿在同一部位連續使用
 - 若刺痛感較強時，請用肥皂沖洗以紓緩不適

成分、含量

100g 中

聯苯乙酸.....3g

醋酸鹽維他命E.....0.5g

L-薄荷醇.....6g

添加物：二異丙醇胺、己二酸二異丙酯、肉豆蔻酸異丙酯、BHT、丙二醇、硫酸鎂、乙醇。

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋，並直立存放在避免陽光直射的涼爽乾燥之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿使用過期的產品。此外，即使在使用期限內，開封後請儘快使用
- (5) 請不要靠近火源
 - 請轉緊瓶蓋，以防液體外漏
 - 塑膠製品（眼鏡架、梳子、馬桶等）、化纖類衣物、木材（上漆的傢俱、地板等）、皮革等製品如不小心沾染到本液體可能造成物品損壞或有色斑，敬請留意
 - 如果附著在衣物上，請迅速按照各衣物的洗滌標識進行清洗

嚴禁火源

第一石油類 危險等級Ⅱ
乙醇含有物

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>