

第2类医药品

中药制剂 コムレケアゼリー

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 被诊断为以下疾病的人请勿服用: 心脏病
2. 仅限在出现症状时服用, 请勿连续服用

咨询事项

1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (3) 老年人
 - (4) 有以下症状的人: 浮肿
 - (5) 被诊断为以下疾病的人: 高血压、肾病
2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

极少数患者会引发以下严重症状, 此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯, 或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难, 并可观察到干咳、发热等现象, 上述症状突然出现或持续不止
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状, 并逐渐加重
充血性心力衰竭、室性心动过速	出现全身乏力、心悸、气短、胸部不适、胸痛、眩晕、昏迷等状况
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等状况

3. 若服用 5~6 次后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册销售商

功能、效果

本品不受体力限制, 皆可使用。用于肌肉急剧痉挛伴发疼痛的以下诸症: 抽筋、肌肉痉挛、腹痛、腰痛

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间将果冻放入口中嚼碎服用

年龄	单次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1包	1天3次
不满15岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

- 1次1包，请勿分次服用
- 餐间意为“两餐之间”，指饭后约2~3小时
- 本剂为果冻型药剂，有水分外溅的情况
开封及服用时请注意避免内容物飞溅
- 请注意避免被开口处割破口唇

<服用方法>

- (1) 立起分包，沿撕开线撕开开口
- (2) 含住开口用手指挤出内容物

成分、含量

每天剂量（3包:33g）中 芍药甘草汤提取物・・・27g

〔从以下中草药中提取〕
芍药・・・6g
甘草・・・6g

辅料：枸橼酸、枸橼酸钠、卡拉胶、刺槐豆胶、白砂糖、祝马丁、三氯蔗糖、对羟基苯甲酸酯、苯甲酸钠、丙二醇、香料等

- 由于本剂采用了天然物（中草药），因此果冻的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉场所
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社
 大阪市中央区道修町 4-4-10
 主页 <https://www.kobayashi.co.jp>