

第2類醫藥品

中藥製劑 コムレケアゼリー

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 被診斷為以下疾病的人請勿服用：心臟病
2. 僅限於出現症狀時服用，請勿連續服用

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 高齡者
 - (4) 有下列症狀者：水腫
 - (5) 接受過以下診斷的人:高血壓、腎病
2. 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

偶有出現以下嚴重症狀的可能。一旦出現，應立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍微活動過量時會出現呼吸急促、呼吸困難、乾咳、發燒等症狀，這些症狀突然出現，或持續不退
假性醛固酮增多症、肌病	出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬，進而出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重
充血性心衰竭 心室心搏過速	出現全身無力、心悸、呼吸急促、胸部不適、胸痛、眩暈、失神等症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀

3. 若服用5~6次後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

無論體力狀況如何皆可使用本劑，用於肌肉急劇痙攣伴隨疼痛的以下症狀：抽筋、肌肉痙攣、腹痛、腰痛

用法、用量

飯前或兩餐之間用請將果凍放入口中壓碎後服用，用量如下

年齡	單次劑量	服用次數
成人（15 歲以上）	1 包	1 天 3 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 僅限 1 次 1 包，請勿分開服用
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時
- 因為是果凍型藥劑，所以會有水分出現
開封及服用時請注意避免內容物飛濺
- 請注意避免被切開處割破口唇

<服用方法>

- (1) 立起分包，沿切開線切開開口
- (2) 咬住切口用手指擠出內容物後並服用

成分、含量

每天用量（3 包:33g）中 芍藥甘草湯萃取物………27g

芍藥………6g

甘草………6g

中萃取

添加物：檸檬酸、檸檬酸鈉、卡拉膠、刺槐豆膠、白糖、索馬甜、三氯蔗糖、對羥基苯甲酸酯、苯甲酸钠、丙二醇、香料等。

- 由於本劑使用了天然藥物（生藥），果凍的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>