

第2类医药品

皮肤・湿疹外用薬 ケアノキュア

使用注意事项

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 有药物过敏史的人
 - (3) 患部不干爽及溃烂严重的人
2. 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀、刺激感（刺痛感）、热感、干燥感

3. 若使用1~2周左右后症状仍无好转，请停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

湿疹、皮炎、溃烂、汗疹、接触性皮炎、瘙痒、尿不湿接触性皮炎

用法、用量

请每天数次，取适量涂抹于患部

〈用法与用量相关的注意事项〉

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- (3) 本品仅限外用
- (4) 请清洁患部后涂抹

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
乌芬那酯	5.0g	(抗炎成分) 皮肤刺激作用小, 非类固醇类抗炎成分直接作用于患部, 消除发红、炎症
苯海拉明	1.0g	(抗组胺成分) 抑制瘙痒的发生
甘草酸	0.3g	(抗炎成分) 消除发红、炎症
醋酸生育酚酯	0.5g	(维生素E) 促进血液循环, 有助皮肤的新陈代谢
异丙基甲基苯酚	0.1g	(杀菌成分) 患部杀菌, 防止细菌感染

辅料: 十六醇、羊毛脂醇、石蜡油、亚油酸异丙酯、二甲聚硅氧烷、聚氧乙烯硬化蓖麻油、硬脂酸聚烃氧酯、硬脂酸甘油酯、1, 3-丁二醇、甘油、黄原胶、聚羧乙烯、依地酸二钠、烟酰胺、硬脂酸钾、对羟基苯甲酸酯、pH 调节剂

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后, 保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中 (可能造成误用或者变质)

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>