

## 第2類醫藥品

外用皮膚濕疹用藥

ケアノキユア

## 使用注意事項

## 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生治療者
  - (2) 有藥物過敏史者
  - (3) 皮膚過於潮濕或潰爛嚴重者
2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、刺激感（火辣感覺）、熱感、乾燥感

3. 若使用1~2週左右後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

濕疹、皮膚炎、潰爛、汗疹、長疹子、發癢、尿布濕導致的疹子

## 用法、用量

1天數次、請取適量塗抹在患部

用法與用量的注意事項

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或者溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本品僅限外用
- (4) 請清潔患部後塗抹

## 成分、含量

100 g 中

成分	含量	作用
烏芬那酯	5.0g	(消炎成分) 是一種對皮膚刺激作用輕微的非類固醇消炎成分，直接作用於患部，可鎮靜發紅、炎症
苯海拉明	1.0g	(抗組織胺劑) 抑制搔癢感的產生
甘草次酸	0.3g	(消炎成分) 鎮靜發紅、發炎
醋酸鹽維生素 E	0.5g	(維生素 E) 促進血液循環，幫助皮膚新陳代謝
異丙基甲基酚	0.1g	(殺菌成分) 患部殺菌，防止細菌感染

添加物：1-十六烷醇、羊毛脂、液態石蠟、亞油酸異丙酯、聚二甲基矽氧烷、聚氧乙烯氫化蓖麻油、硬脂酸聚氧酯、硬脂酸甘油酯、1,3-丁二醇、甘油、黃原膠、羧乙烯基聚合物、乙二胺四乙基二鈉、菸鹼醯胺、硬脂酸鉀、對羥基苯甲酸酯、pH 調節劑

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>