

## 第2类医药品

## 中药制剂 漢方ナイトミン

## 使用注意事项

## 咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - 正在接受医生治疗的人
  - 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - 胃肠虚弱的人
  - 腹泻或有腹泻倾向的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
消化系统	恶心、食欲不振、胃部不适

- 服用后可能会出现以下症状，若该症状持续或加重，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商：腹泻
- 若服用1周左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

体力中等以下，有身心疲乏、精神不安、失眠等症状的以下诸症：失眠症、神经症

## 用法、用量

请按照以下剂量，于餐间以水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15岁以上）	4片	3次
不满15岁	× 不可服用	

<用法用量相关的注意事项>

- 请严格遵守规定的用法与用量
  - 本品易受潮，因此每次服用后请务必盖紧瓶盖
- 餐间是指“两餐之间”，即餐后约2~3个小时

## 成分、含量

每日用量（12片）中

含酸枣仁汤提取物…1500 mg

<中草药换算量>

酸枣仁	7500 mg	知母	2250 mg
川芎	2250 mg	茯苓	3750 mg
甘草	750 mg		

辅料：无水硅酸、乳糖、CMC-Ca、羟丙基纤维素、硬脂酸镁

●本品采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

## 保管及使用注意事项

- （1）请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- （2）请将本品放在儿童接触不到的地方
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- （4）请勿用湿手拿取本品
- （5）瓶中填充物用于防止药剂在运送时受损，开封时请丢弃
- （6）请勿服用干燥剂

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>