

第 2 類醫藥品

中藥製劑 漢方ナイトミン

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 胃腸虛弱者
 - 腹瀉或有腹瀉傾向者
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
消化器官	想吐、食慾不振、胃部不適

- 服用後有時會出現下列症狀，如果這些症狀一直持續或加重，請停止服用，並持說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢：腹瀉
- 服用 1 週左右後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

體力中等以下之人士，患有伴隨身心疲乏，精神不安，失眠等症狀的下列症狀：失眠症、神經症

用法、用量

請按照下列劑量，於餐間以水或溫水服用。

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	4 錠	3 次
未滿 15 歲	x 不可服用	

<用法、用量相關注意事項>

- 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - 本藥劑易受潮，每次服用後應蓋緊瓶蓋
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時。

成分、含量

每天用量（12片）中

酸棗仁湯萃取物…1500mg

<原生中藥換算量>

酸棗仁……………7500 mg	知母……………2250 mg
川芎……………2250 mg	茯苓……………3750 mg
甘草……………750 mg	

添加物：無水矽酸、乳糖、CMC-Ca、羥丙基纖維素、硬脂酸鎂

●本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- （1）請將瓶蓋蓋緊後，存放在避免陽光直射的涼爽之處
- （2）請存放在幼兒拿不到的地方
- （3）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- （4）請勿用潮濕的手拿取本藥劑
- （5）瓶中的充填物是用於防止藥劑在運送時受損，開封時請丟掉
- （6）請勿服用容器內的乾燥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>