

第2类医药品

中药制剂 コエキユア

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)
哺乳中的妇女不能服用本品, 需服用本品时请停止哺乳

咨询事项

- 下列人群请在服用前向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - 正在接受医师治疗的人
 - 妊娠或有妊娠可能的妇女
 - 身体虚弱的人(体力衰弱、身体较弱的人)
 - 胃肠虚弱易腹泻的人
 - 高龄者
 - 曾因药物等引起过皮疹、发红、发痒等症状的人
 - 有以下症状的人: 浮肿
 - 被诊断为以下疾病的人: 高血压、心脏病、肾病
- 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒
消化系统	食欲不振、胃部不适、伴有剧烈腹痛的腹泻、腹痛

本品偶尔会引发以下严重症状, 此时请立即接受医师的治疗

症状的名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状, 并逐渐加重

- 服用后有可能出现下列症状, 若这些症状不见好转或持续恶化, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
软便、腹泻
- 若服用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
- 长期连续服用时, 请向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

声音沙哑、咽喉不适

注) 无关体力, 均可服用。

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或温水送服

年龄	单次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1包	1天3次
7岁以上未满15岁	2/3包	
未满7岁	× 不可服用	

<用法与用量的相关注意事项>

- （1）请严格遵守规定的用法与用量
 - （2）儿童请在监护人的监督指导下服用
- 餐间意为“两餐之间”，指饭后约2~3小时

成分、含量

每日用量(3包:6.0g)中 含响声破笛丸料提取物···3.5g

<从以下中草药中提取>

连翘·····2.5g	桔梗·····2.5g	甘草·····2.5g
大黄·····1.0g	缩砂·····1.0g	川芎·····1.0g
诃子·····1.0g	儿茶·····2.0g	薄荷·····4.0g

辅料：纤维素、硬脂酸镁、无水硅酸、丙二醇、L-薄荷醇、三氯蔗糖、乳糖

- 由于本剂采用了天然产物（草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- （1）保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- （2）请将本品放在儿童不能接触的地方
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- （4）若1包分多次服用时，剩下的药剂请将药袋的封口至少折两折后存放
此外，存放的剩余药剂，请于当天服用完毕或丢弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>