

第2類醫藥品

中藥製劑 コエキユア

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)
 哺乳中的婦女請勿服用本劑，需服用本劑時請避免哺乳

諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
- (3) 身體虛弱者(體力衰退、身體虛弱者)
- (4) 胃腸虛弱易腹瀉者
- (5) 高齡者
- (6) 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
- (7) 有下列症狀者：水腫
- (8) 接受過以下診斷的人:高血壓、心臟病、腎病

2. 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	食欲不振、胃部不適、伴有劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

偶有出現以下嚴重症狀的情況。一旦出現，應立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬，進而出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重

3. 服用後有可能出現下列症狀，若此類症狀持續或惡化，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

軟便、腹瀉

4. 如服用5~6天後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

5. 欲長期連續服用時，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

聲音沙啞、咽喉不適

(備註) 無關體力，皆可服用。

用法、用量

飯前或兩餐之間用溫水或水服用，用量如下

年齡	單次劑量	服用次數
成人（15 歲以上）	1 包	1 天 3 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
未滿 7 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - (2) 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

成分、含量

每天用量(3 包:6.0g)中 含響聲破笛丸料萃取物…… 3.5g

<原生中藥換算量>

連翹 2.5g	桔梗 2.5g	甘草 2.5g
大黃 1.0g	野薑花 1.0g	川芎 1.0g
青剛櫟 1.0g	阿仙藥 2.0g	薄荷 4.0g

添加物：纖維素、硬脂酸鎂、無水矽酸、丙二醇、薄荷醇、三氯蔗糖、乳糖

●由於本劑使用了天然物（草藥），顆粒的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 若 1 包分多次服用時，剩下的藥劑請將藥袋的封口折 2 折以上來存放
此外，存放的剩餘藥劑，請於當天內服用完畢或丟棄

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>