

## 第②类医药品

## 消炎镇痛剂 コリホグス

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应及事故)

1. 下列人群请勿服用
  - (1) 对本品或本品成分有过敏史的人
  - (2) 曾因服用本品或其他解热镇痛药、感冒药出现过哮喘的人
  - (3) 不满 15 岁的儿童
2. 服用本品期间, 请勿服用以下任何医药品  
其他解热镇痛药、感冒药、镇静药
3. 服用后, 禁止驾驶或者进行机械类的操作 (可能会出现嗜睡)
4. 服用前后禁止饮酒
5. 请勿长期连续服用

## 咨询事项

1. 下列人群请在服用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生或牙医治疗的人
  - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - (3) 哺乳期的妇女
  - (4) 老年人
  - (5) 有药物等过敏史的人
  - (6) 被诊断为下列疾病的人: 心脏病、肾病、肝病、胃・十二指肠溃疡
2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
面部	肿胀
消化系统	恶心・呕吐、食欲不振
精神神经系统	眩晕
其他	体温过低

极少数人会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状
皮肤黏膜眼综合症 (史-约综合征) 中毒性表皮坏死松解症	高热、眼睛充血、眼屎、口唇溃烂、咽喉疼痛、皮肤大范围出疹与发红等症状的持续出现或突然加重
哮喘	出现呼吸时有哮鸣音。出现呼吸困难等症状

3. 若服用 5~6 次后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

### 功能、效果

肩颈部肌肉疼痛及僵硬、腰痛、背痛、扭伤、挫伤、神经痛、风湿性疼痛、四十肩、关节痛、肌炎、肌腱炎

### 用法、用量

请按照以下剂量，在疼痛时或发作时用水或白开水送服（1 日不超过 2 次）

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15 岁以上)	1~2 片	最多 2 次
不满 15 岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

- 初次服用者建议起始剂量为 1 片  
之后根据情况，1 次服用 1~2 片

### 成分、含量

2 片中

成分	含量	作用
氯唑沙宗	300 mg	缓解肌肉僵直、肩部酸痛
乙柳酰胺	300 mg	消除肩部酸痛等身体疼痛
咖啡因水合物	50 mg	防止药剂引起的困意

辅料：甲基纤维素

### 保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社  
大阪市中央区道修町 4-4-10  
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>