

第②類醫藥品

消炎鎮痛劑 コリホグス

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用及事故)

1. 下列人士不可服用
 - (1) 曾因本劑或本劑成分產生過敏反應者
 - (2) 曾服用本劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥後出現過哮喘者
 - (3) 不滿 15 歲的兒童
2. 服用本劑期間，請勿服用以下任何醫藥品
其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮定劑
3. 服用後，禁止開車或者進行機械類的操作（會出現嗜睡感）
4. 服用前後禁止喝酒
5. 請勿長期連續使用

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、牙醫、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生或牙醫治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 哺乳中的婦女
 - (4) 高齡者
 - (5) 有藥物過敏史者
 - (6) 診斷出有以下症狀者：心臟病、腎臟病、肝病、胃及十二指腸潰瘍
2. 服用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
臉部	腫脹
消化器官	想吐、嘔吐，食慾不振
精神神經系統	眩暈
其他	體溫過低

偶有出現以下嚴重症狀的情況，一旦出現，請立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀
皮膚黏膜眼症候群 (史蒂芬強森症候群) 毒性表皮壞死溶解症	高燒、眼睛充血、眼屎、口唇潰瘍、喉嚨疼痛、皮膚大範圍起疹子和發紅等症狀持續、突然加重
哮喘	呼吸時有雜音。出現呼吸困難等症狀

3. 服用5~6次後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

肩頸部疼痛及僵硬、腰痛、背痛、扭傷、挫傷、神經痛、風濕性疼痛、四十肩、關節疼痛、肌肉炎、肌腱炎

用法、用量

疼痛或發作時用請用水或溫水服用，用量如下（1天不超過2次）

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	1~2錠	最多2次
未滿15歲	x 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

● 第一次服用者建議從1錠開始服用

根據情況，1次服用1~2錠

成分、含量

2錠中

成分	含量	作用
氯宗洒宗	300 mg	緩和肌肉僵直、肩頸痠痛
乙氧基苯醯胺	300 mg	消除肩頸痠痛等身體疼痛
咖啡因水合物	50 mg	防止藥劑引起的睡意

添加物：甲基纖維素

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在乾燥涼爽處，避免陽光直射
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>