

中药制剂

## 漢方ナイトミン抑肝散錠

販売名：漢方ナイトミン 抑肝散錠

## 使用注意事項

## 咨询事项

- 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - 正在接受医生治疗的人
  - 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - 胃肠虚弱的人
  - 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯，或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难，并可观察到干咳、发热等现象，上述症状突然出现或持续不止
心力衰竭	活动时呼吸困难、容易疲劳、脚浮肿、体重突然增加
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状

- 若服用约1个月后症状仍无好转，请停止服用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

以中等程度体力为标准，神经紧张、易怒、烦躁等，及以下各症状：神经症、失眠症、磨牙、更年期障碍、血道症<sup>注)</sup>

注)“血道症”是指伴随月经、妊娠、分娩、产后、更年期等女性荷尔蒙变动所出现的精神不安和焦躁等神经精神症状以及身体症状

## 用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15岁以上)	4片	2次
不满15岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

- 餐间是指“两餐之间”，即餐后约2~3个小时

## 成分、含量

每日用量（8片）中

抑肝散提取物（3/5量）…1.98 g

<中草药换算量>

当归	•••••	1.8 g	钩藤钩	•••••	1.8 g
川芎	•••••	1.8 g	苍术	•••••	2.4 g
茯苓	•••••	2.4 g	柴胡	•••••	1.2 g
甘草	•••••	0.9 g			

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、硬脂酸镁、乳糖

●本品采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

## 保管及使用注意事项

- (1) 请将盖子盖紧，存放在避免阳光直射，低湿度的阴凉处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本品

销售商：小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页：<https://www.kobayashi.co.jp>