

## 第2類醫藥品

中藥製劑

## 漢方ナイトミン抑肝散錠

販売名：漢方ナイトミン 抑肝散錠

## 使用注意事項

## 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - 胃腸虛弱者
  - 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
- 服用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍微活動過量時會出現呼吸急促、呼吸困難、乾咳、發燒等症狀，這些症狀突然出現，或持續不退
心臟衰竭	活動時呼吸困難、容易疲倦、腳腫脹、體重突然增加
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀

- 服用約1個月後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

以體力中等程度為基準，神經緊張、易怒、煩躁者，及下列各項症狀：神經症、失眠症、磨牙、更年期障礙、血道症<sup>注)</sup>

注)所謂「血道症」，是指伴隨月經、妊娠、分娩、產後、更年期等因女性荷爾蒙變動而產生的精神不安和焦躁等精神神經症狀以及身體症狀

## 用法、用量

飯前或餐間用溫水或水服用，用量如下

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人(15歲以上)	4錠	2次
未滿15歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時

## 成分、含量

每天用量（8片）中

抑肝散萃取物（3/5 量）…1.98g

<原生中藥換算量>

當歸…………… 1.8 g	嘴葉鉤藤…………… 1.8 g
川芎…………… 1.8 g	蒼朮…………… 2.4 g
茯苓…………… 2.4 g	柴胡…………… 1.2 g
甘草…………… 0.9g	

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、硬脂酸鎂、乳糖

●本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊蓋子，保存於不會直曬陽光，濕度低的陰涼處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商：小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站：<https://www.kobayashi.co.jp>