

第3类医药品

含有L-半胱氨酸 以维生素C为主药的制剂

ケシミンL C錠プラス

使用注意事项

咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 有药物等过敏史的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并拿着该药袋向医师、药剂师或注册销售员咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	恶心、呕吐、胃部不适、腹痛

- 服用后可能会出现以下症状，若该症状持续或加重，应停止服用，并拿着该药袋向医师、药剂师或注册销售员咨询
腹泻、便秘
- 服用1个月左右症状仍未好转时，应停止服用，并拿着该药袋向医师、牙医、药剂师或注册销售员咨询
- 服用后可能会导致生理期提前，经血量略微增多
长时间持续出血时，请持药袋向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

- 缓解以下各症状：斑点、雀斑、因晒伤或斑疹导致色素沉着
- 以下情况时防止出血：牙龈出血、流鼻血“但使用1个月左右后这些症状仍未改善时，应咨询医师、药剂师或牙科医师。”
- 以下情况时维生素C的补充：身体疲劳时、怀孕及哺乳期、病时病后体力下降时、老年期

用法、用量

请按以下剂量，早晚用水或温水服用

年龄	单次剂量	每天服用次数
成人（15岁以上）	3片	一天2次
7岁以上未满15岁	1片	
未满7岁	× 不可服用	

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 儿童服药时，请于监护人的监督下服用

成分、含量

每日用量（6片）中

成分	含量
抗坏血酸（维生素 C）	1000 mg
L-半胱氨酸	240 mg
核黄素（维生素 B ₂ ）	6 mg
盐酸吡哆醇（维生素 B ₆ ）	12 mg
琥珀酸 d-α-生育酚（天然型维生素 E）	50 mg

辅料：玉米淀粉、结晶纤维素、交联羧甲基纤维素钠、硅酸铝镁、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素、氧化钛、聚乙二醇、巴西棕榈蜡

<成分与含量的注意事项>

- 服用本药可能会影响尿液和大便的检查值，因此在接受相关检查时，请告知医师您正在服用本药
- 服用本药后，尿液可能会变黄，这是由于本药剂中所含的核黄素（维生素 B₂）引起的，无需担心

保管及使用注意事项

- (1) 请将盖子盖紧，存放在避免阳光直射，低湿度的阴凉处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 若容器拉链的闭合方式不充分，本药剂可能会因受潮等因素的影响而变质，因此每次服用后务必将拉链紧紧拉好
- (5) 请勿用湿手触碰。如果水分附着在药片上，药片表面可能会部分溶解，进而出现变色或颜色不均的情况。此外，若将湿药片放回药袋，会影响其他药片，因此请勿放回
- (6) 请勿服用超过使用期限（标注于包装底部）的产品。此外，即使在期限内，一旦开封后，从保持品质的角度出发，需在开封日起6个月内服用完毕

销售商 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>