

第3類醫藥品

含有L-半胱胺酸 維生素C 主藥製劑

ケシミンL C錠プラス

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 對藥物有過敏反應者
- 服用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持此藥袋諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售員

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、胃部不適、腹痛

- 服用後有時會出現下列症狀，如果這些症狀一直持續或加重，請停止服用，並持此藥袋諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售員
腹瀉、便秘
- 若服用此藥約一個月後症狀仍未改善，請停止服用，並持此藥袋諮詢醫生、牙科醫生、藥劑師或註冊銷售員
- 服用後可能會導致生理期提前、經血量略微增多
長時間持續出血時，並持此藥袋諮詢醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

- 緩解下列各項症狀：斑點、雀斑、因曬傷・斑疹的色素沉澱
- 預防下列情況下的出血：牙齦出血、流鼻血「但關於這些症狀，即使使用1個月左右也不見改善的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或牙科醫師。」
- 補給下列情況下的維生素C：身體疲勞時、懷孕・哺乳期、病中病後的體力低下時、老年期

用法、用量

請於早晚以水或溫開水，服用下列劑量

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	3錠	一天2次
7歲以上未滿15歲	1錠	
未滿7歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 讓幼兒服用時，請於監護人的監督下服用

成分、含量

每天用量（6錠）中

成分	含量
抗壞血酸（維生素 C）	1000 mg
L-半胱胺酸	240 mg
核黃素（維生素 B ₂ ）	6 mg
吡哆醇鹽酸鹽（維生素 B ₆ ）	12 mg
琥珀酸 d- α -生育酚（天然型維生素 E）	50 mg

添加物：玉米澱粉、結晶纖維素、交聯羧甲基纖維素鈉、矽酸鋁鎂、硬脂酸鎂、羥丙甲纖維素、氧化鈦、聚乙二醇、巴西棕櫚蠟

<成分與含量的注意事項>

- 服用本藥劑，可能會對尿液及大便的檢驗值造成影響，因此接受這些檢驗的情況下，請告知醫師您正在服用本藥劑
- 服用本藥劑，可能會使尿液變黃，這是因本藥劑所含的核黃素（維生素 B₂）所致，無需擔心

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊蓋子，保存於不會直曬陽光，濕度低的陰涼處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中。（可能造成誤用或者變質）
- (4) 容器的壓條沒有壓緊的情況下，本藥劑可能因受潮等影響而變質，因此每次服用後，請務必確實壓緊壓條
- (5) 請勿以濕手觸碰。水分附著於錠劑，表面可能會部分溶解，導致變色或顏色不均。此外，將濕掉的錠劑放回藥袋，亦會對其他錠劑造成影響，因此請勿放回
- (6) 請勿服用超過使用期限（標示於包裝下方）的產品。此外，即使在有效期限內，基於維持品質的觀點，請於開封後 6 個月內服用完畢

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>