

第 2 类医药品

鼻炎口服药 カユノード

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守，将会导致当前症状恶化或易引起不良反应或事故)

- 1. 下列人群请勿服用
 对本品或本品成分有过敏史的人
- 2. 服用本品期间，请勿服用以下任何医药品
 其他鼻炎口服药、含有抗组胺的口服药物等
 (感冒药、止咳化痰药、晕车药、过敏药等)
- 3. 服用后，禁止驾驶或者进行机械类的操作
 (可能会出现嗜睡)
- 4. 请勿长期连续服用

咨询事项

- 1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (3) 处于哺乳期的妇女
 - (4) 老年人
 - (5) 有药物过敏史的人
 - (6) 有以下症状的人：高热、排尿困难、浮肿
 - (7) 曾患过以下疾病的人：青光眼、糖尿病、甲状腺功能障碍、心脏病、高血压、肾病
- 2. 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	恶心・呕吐、食欲不振
泌尿系统	排尿困难

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克（过敏性反应）	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸（皮肤及白眼球发黄）、褐色尿、全身乏力、食欲不振等症状
假性醛固酮增多症、肌病	在手脚无力、麻木、紧绷感和僵硬的基础上，还会出现无力感、肌肉疼痛，并逐渐加重
血小板减少	由于血液中的成分血小板数量减少，会出现流鼻血、牙龈出血、淤青等出血症状

3. 服用后有可能出现下列症状，如症状持续或加重，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

口干、嗜睡

4. 若服用 5~6 天后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

缓解急性鼻炎、过敏性鼻炎或鼻窦炎引起的以下各症状:打喷嚏、流鼻涕（流涕过多）、鼻塞、流泪、咽喉痛、头重（头部沉重感）

用法、用量

请服用以下的量。但是，服用间隔请保持 4 小时以上。

年 龄	1 次量	每天服用次数
成人(15 岁以上)	1 包	3 次
为未满 15 岁	× 请勿服用	

<用法与用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法、用量

●不用水也可以服用

成分、含量

每天量(3 包: 3g)中

成分	含量
美唑他嗪	4mg
盐酸去氧肾上腺素	30mg
甘草酸二钾	200mg

辅料：赤藓糖醇、1-薄荷醇、玉米淀粉、二氧化硅、滑石、香料、乙醇、无水硅酸

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商：小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页：<https://www.kobayashi.co.jp>