

第2類醫藥品

鼻炎內服藥 カユノード

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用及事故)

1. 下列人士請勿使用
對本劑或本劑成分曾有過敏反應者
2. 服用本劑期間，請勿服用以下任何醫藥品
其他鼻炎內服藥、含有抗組織胺的內服藥等
(感冒藥、止咳化痰藥、暈車藥、過敏藥等)
3. 服用後，禁止開車或者進行機械類的操作
(會出現嗜睡感)
4. 請勿長期連續服用

諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 哺乳中的婦女
 - (4) 高齡者
 - (5) 曾對藥物過敏反應者
 - (6) 有以下症狀者：高燒、排尿困難、水腫
 - (7) 接受過以下診斷的人：青光眼、糖尿病、甲狀腺機能障礙、心臟病、高血壓、腎病
2. 服用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	想吐、嘔吐、食慾不振
泌尿器官	排尿困難

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀
假性醛固酮增多症、肌肉病變	除了手腳無力、發麻、緊繃和僵硬之外，出現虛脫感、肌肉痛，逐漸加劇
血小板減少	血液成分血小板的數量減少，導致流鼻血、牙齦出血、瘀青等出血症狀

3. 服用後有可能出現下列症狀，若該症狀持續不止或增強時，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
口乾、嗜睡
4. 服用5~6天後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

緩解急性鼻炎、過敏性鼻炎或鼻竇炎引起的下列各項症狀：打噴嚏、流鼻水（鼻水過多）、鼻塞、流淚、喉嚨痛、頭重（頭部沉重）

用法、用量

請服用下列劑量。但下次服用請間隔4小時以上。

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	1包	3次
未滿15歲	× 請勿服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 不用水也可以服用

成分、含量

每天用量(3包：3g)中

成分	含量
美奎塔令	4 mg
鹽酸苯腎上腺素	30 mg
甘草酸二鉀	200 mg

添加物：赤藻糖醇、l-薄荷醇、玉米澱粉、二氧化矽、滑石、香料、乙醇、無水矽酸

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中 (可能造成誤用或者變質)

銷售商：小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站：<https://www.kobayashi.co.jp>