

## 第2类医药品

中药制剂

ムクノーズ

## 使用注意事項

## 咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - 正在接受医生治疗的人
  - 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - 身体虚弱的人（体力衰弱的人、身体较弱的人）
  - 胃肠虚弱的人
  - 容易出汗的人
  - 老年人
  - 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
  - 有以下症状的人：浮肿、排尿困难
  - 诊断为患有以下疾病的患者：高血压、心脏病、肾病、甲状腺功能障碍
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并携此包装向医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化器官	恶心、食欲不振、胃部不适

极少数患者会会引发下列严重症状。时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯，或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难，并可观察到干咳、发热等现象，上述症状突然出现或持续不止
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状，并逐渐加重
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状

- 若服用1个月左右（感冒时5~6天）后，症状仍无好转，请停止服用，并携此包装向医生、药剂师或者注册经销商
- 长期连续服用时，请咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

体力中等或稍弱、伴有稀水样痰的咳嗽和流涕的以下各种症状：支气管炎、支气管哮喘、鼻炎、过敏性鼻炎、浮肿、感冒、花粉症

**用法、用量**

请按照以下剂量，餐前或餐间用水或温水服用

年 龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15 岁以上）	4 片	3 次
7 岁以上未满 15 岁	3 片	
5 岁以上未满 7 岁	2 片	
未满 5 岁	× 不可服用	

**<用法与用量的注意事项>**

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
  - (2) 儿童服药时，请于监护人的监督下服用
- 餐间是指“两餐之间”，指餐后约 2~3 小时

**成分、含量**

每日用量（12 片）中 含小青龙汤提取物(1/2 量) 2.5g

**<中草药换算量>**

半夏 3.0g、甘草 1.5g、桂皮 1.5g、五味子 1.5g、细辛 1.5g、芍药 1.5g、  
麻黄 1.5g、生姜 1.5g

辅料：CMC-Ca、氢氧化铝/镁、偏硅酸铝镁、硬脂酸镁、聚氧乙烯聚氧丙二醇、纤维素

- 由于本剂采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

**保管与使用注意事项**

- (1) 请妥善封紧夹链袋，并在避光阴凉处保管。
- (2) 请将本品放在儿童不易接触的地方
- (3) 请勿倒入其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用沾水的手拿取本药剂

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>