

## 第2類醫藥品

中藥製劑

ムクノーズ

## 使用注意事項

## 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - 身體虛弱者（體力衰退者、身體較弱者）
  - 胃腸虛弱者
  - 容易冒汗者
  - 高齡者
  - 曾因藥物等引起長疹子、發紅、發癢等症狀者
  - 有下列症狀者：浮腫、排尿困難
  - 診斷為下列疾病的患者：高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	想吐、食慾不振、胃部不適

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍微活動過量時會出現呼吸急促、呼吸困難、乾咳、發燒等症狀，這些症狀突然出現，或持續不退
假性醛固酮增多症、肌病	出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬之外，還出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀

- 若服用約1個月左右（感冒時則5~6天）症狀仍無改善，請停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 欲長期連續服用時，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

適用於體力中等或稍微虛弱，咳嗽時伴隨透明的水狀痰液或流鼻水之下列各種症狀：支氣管炎、支氣管哮喘、鼻炎、過敏性鼻炎、浮腫、感冒、花粉症

## 用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年 齡	單次劑量	1 天服用次數
成人（15 歲以上）	4 錠	3 次
7 歲以上未滿 15 歲	3 錠	
5 歲以上未滿 7 歲	2 錠	
未滿 5 歲	x 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
  - (2) 讓幼兒服用時，請於監護人的監督下服用
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

## 成分、含量

每天用量（12 錠）中 含小青龍湯萃取物(1/2 量) 2.5g

<原生中藥換算量>

半夏 3.0g、甘草 1.5g、桂皮 1.5g、五味子 1.5g、細辛 1.5g、芍藥 1.5g、麻黃 1.5g、生薑 1.5g

添加物：CMC-Ca、氫氧化鋁／氫氧化鎂、偏矽酸鎂鋁、硬脂酸鎂、聚氧乙烯聚氧丙烯二醇、纖維素

- 由於本產品採用了天然產物（生藥），因此錠劑的顏色多少會有差異

## 保管與使用上的注意事項

- (1) 請確實封緊夾鏈袋，並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>