

第2类医药品

皮肤・湿疹外用薬 耳まわり治療薬 ミーミエイド

販売名：ミーミエイド

使用注意事項

咨询事项

- 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 有药物过敏史的人
 - 患部不干爽及溃烂严重的人
- 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀、刺激感（刺痛感）、热感、干燥感

- 若使用1~2周左右后症状仍无好转，请停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

湿疹、皮炎、溃烂、汗疹、接触性皮炎、瘙痒、尿不湿接触性皮炎

用法、用量

请每天数次，取适量涂抹于患部

〈用法与用量相关的注意事项〉

- 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- 本品仅限外用
- 请清洁患部后涂抹

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
乌芬那酯	5.0g	非类固醇性的抗炎成分，直接作用于患部，退红消炎。
苯海拉明	1.0g	抗组织胺成分，抑制发痒。
甘草酸	0.3g	抗炎成分，退红消炎。
醋酸生育酚酯	0.5g	维生素 E 成分，促进血液循环，帮助皮肤代谢。
苜蓿氯铵	0.1g	杀菌成分，抑制杂菌滋生。

辅料：凡士林、硬脂醇、十六烷醇、硬脂酸甘油酯、棕榈酸异丙酯、山嵛醇、聚氧乙烯醚、二甲聚硅氧烷、对羟基苯甲酸酯、BHT

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>