

第2類醫藥品

外用皮膚·濕疹用藥 ミーミエイド

使用注意事項

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 有藥物過敏史者
- (3) 皮膚過於潮濕或潰爛嚴重者

2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、刺激感（火辣感覺）、熱感、乾燥感

3. 若使用1~2週左右後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

濕疹、皮膚炎、潰爛、汗疹、長疹子、發癢、尿布濕導致的疹子

用法、用量

1天數次、請取適量塗抹在患部

用法與用量的注意事項

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或者溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本品僅限外用
- (4) 請清潔患部後塗抹

成分、含量

100 g 中

成分	含量	作用
烏芬那酯	5.0 g	非類固醇性的抗發炎成分，直接作用於患部，退紅消炎。
苯海拉明	1.0 g	抗組織胺成分，抑制發癢。
甘草次酸	0.3 g	抗發炎成分，退紅消炎。
醋酸鹽維生素 E	0.5 g	維他命 E 成分，促進血液循環，幫助皮膚代謝。
氯化本索寧	0.1 g	殺菌成分，抑制雜菌滋生。

添加物：凡士林、硬脂醇、1-十六烷醇、硬脂酸甘油酯、棕櫚酸異丙酯、二十二醇、聚氧乙炔醚、聚二甲基矽氧烷、對羥基苯甲酸酯、BHT

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>