

第 2 类医药品

中药制剂 ミズナイン

使用注意事项

咨询事项

- 1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (3) 身体虚弱的人（体力衰弱、身体较弱的人）
 - (4) 肠胃虚弱的人
 - (5) 容易上火、面部潮红且体力充沛的人
 - (6) 容易出汗的人
 - (7) 高龄者
 - (8) 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
 - (9) 有以下症状的人：浮肿、排尿困难
 - (10) 诊断为患有以下疾病的患者：高血压、心脏病、肾病、甲状腺功能障碍
- 2. 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并拿着该药袋向医师、药剂师或注册销售员咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	恶心、食欲不振、胃部不适
其他	心悸、上火、潮热、口舌发麻

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状，并逐渐加重

- 3. 若服用约 1 个月后症状仍无好转，请停止服用，并拿着该药袋向医师、药剂师或注册销售员咨询
- 4. 长期连续服用时，请向医生、药剂师或者注册销售商咨询
- 5. 服用本药剂后，偶尔会出现症状恶化的情况，因此在这种情况下，应停止服用，并拿着该药袋向医师、药剂师或注册销售员咨询

功能、效果

中度体力以上、虚寒体质、浮肿、口渴、出汗，有时伴有尿量减少等症状，并有以下症状：浮肿、关节肿胀或疼痛、肌肉疼痛、湿疹/或皮炎、夜尿症、眼睛瘙痒/疼痛

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或热水送服

年 龄	单次剂量	每天服用次数
成人（15 岁以上）	4 片	1 天 3 次
不满 15 岁	× 不可服用	

＜用法与用量相关的注意事项＞

请严格遵守规定的用法与用量

●餐间意味着“两餐之间”，指饭后约 2～3 小时

成分、含量

每天剂量（12 片）中 越婢加术汤精华 2.6g

＜从以下中草药中提取＞

麻黄	3.0g	石膏	4.0g
苍术	2.0g	附子粉	0.5g
生姜	0.5g	甘草	1.0g
大枣	1.5g		

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、乳糖、硬脂酸镁

●本品采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- （1）请将盖子盖紧，存放在避免阳光直射，低湿度的阴凉处
- （2）请将本品放在儿童接触不到的地方
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- （4）请勿用湿手接触本品

销售商 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>