

## 第2類醫藥品

## 中藥製劑 ミズナイン

## 使用注意事項

## 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - 身體虛弱者（體力衰退、身體虛弱者）
  - 腸胃弱的人
  - 容易上火、臉部潮紅且體力充足的人
  - 容易冒汗者
  - 高齡者
  - 曾因藥物等引起長疹子、發紅、發癢等症狀者
  - 有下列症狀者：水腫、排尿困難
  - 診斷為下列疾病的患者：高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙
- 服用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持此藥袋諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售員

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	想吐、食欲不振、胃部不適
其他	心悸、上火、潮熱、口唇舌頭發麻

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	強出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬，進而出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重

- 若服用約1個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並持此藥袋諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售員
- 欲長期連續服用時，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 在極少數情況下，服用此藥後症狀可能會惡化。如果發生這種情況，請停止服用，並持此藥袋諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售員

## 功能、效果

體力中等程度以上、虛寒體質、浮腫、口渴、出汗，有時尿量減少，並有以下症狀：  
浮腫、關節腫脹疼痛、肌肉痛、濕疹/皮膚炎、夜尿症、眼睛癢/痛

## 用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年 齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	4 錠	一天 3 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

## 成分、含量

每天用量(12 錠)中 越婢加朮湯精華 2.6g

<原生中藥換算量>

麻黃	3.0g	石膏	4.0g
蒼朮	2.0g	附子粉	0.5g
生薑	0.5g	甘草	1.0g
大棗	1.5g		

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、乳糖、硬脂酸鎂

- 本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊蓋子，保存於不會直曬陽光，濕度低的陰涼處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>