

第2类医药品

中药制剂 モレナクト

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应及事件)

下列人群请勿服用

- (1) 肠胃虚弱的人
- (2) 容易腹泻的人

咨询事项

1. 下列人群请在使用前请向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - (1) 正在接受医师治疗的人
 - (2) 妊娠或有妊娠可能的妇女
 - (3) 容易上火、面部潮红且体力充沛的人
 - (4) 曾因药物等引起过皮疹、发红、发痒等症状的人
2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并携此包装向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒
消化器官	食欲不振、胃部不适、腹痛
其他	心悸、上火、口舌发麻

3. 服用后可能会出现下列症状, 若该症状持续或加重, 请停止服用, 并携此包装向医生、药剂师或者注册经销商: 腹泻
4. 服用约1个月后症状仍无好转, 请停止服用, 并携此包装向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

体力中等以下, 容易疲劳, 手脚畏寒, 尿量减少或多尿, 有时口渴的以下各种症状: 下肢疼痛、腰痛、发麻、高龄者的视力模糊、瘙痒、排尿困难、尿不尽、夜尿症、尿频、浮肿、高血压伴随症状的改善(肩酸、头重、耳鸣)、轻微的漏尿

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或温水送服

年 龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15 岁以上)	4 片	3 次
7 岁以上不满 15 岁	3 片	3 次
不满 15 岁	× 不可服用	

<用法与用量的相关注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 幼儿应在监护人的监督指导下服用
- 餐间意为“两餐之间”，指饭后约 2~3 小时

成分、含量

每日用量（12 片）中 含八味地黄丸提取物（1 / 2 量）2.30g

〈从以下中草药中提取〉	
地黄 2.5g	山茱萸 1.5g
山药 1.5g	泽泻 1.5g
茯苓 1.5g	牡丹皮 1.5g
桂皮 0.5g	附子粉 0.5g

辅料：无水硅酸、硅酸铝、纤维素、CMC-Ca、玉米淀粉、硬脂酸镁、乳糖

- 本品采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本品

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>