

第2類醫藥品

中藥製劑 **モレナクト**

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能會使目前的症狀惡化，或容易產生副作用及事故)

下列人士不可服用

- (1) 腸胃弱的人
- (2) 容易腹瀉的人

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 容易上火、臉部潮紅且體力充足的人
 - (4) 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
2. 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	食慾不振、胃部不適、腹痛
其他	心悸、上火、口唇舌頭發麻

3. 服用後可能會出現以下症狀，若該症狀持續不止或增強時，請停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢：腹瀉
4. 若服用約1個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

適用於體力中等以下，容易疲倦，四肢容易發冷，尿量減少或多尿，有時感到口渴之下列各種症狀：下肢疼痛、腰痛、發麻、老年人視力模糊、發癢、排尿困難、殘尿感、夜尿、頻尿、浮腫、高血壓的相關伴隨症狀的改善（肩膀僵硬、頭重、耳鳴）、輕度漏尿

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年 齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	4 錠	3 次
7 歲以上未滿 15 歲	3 錠	3 次
未滿 7 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - (2) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

成分、含量

每天用量（12 錠）中 八味地黃丸萃取物（1/2 量）2.30g

地黃 2.5g	山茱萸 1.5g
山藥 1.5g	澤瀉 1.5g
茯苓 1.5g	牡丹皮 1.5g
桂皮 0.5g	附子粉 0.5g

中萃取

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、纖維素、CMC-Ca、玉米澱粉、硬脂酸鎂、乳糖

●由於本產品採用了天然產物（生藥），因此錠劑的顏色多少會有差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請確實封緊夾鏈袋，並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>