

第2类医药品

止痒消炎药 ムズメン

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

请勿用于下列部位: 眼睛周围、粘膜等

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
- (3) 有药物等过敏史的人
- (4) 患部不干爽及溃烂严重的人
- (5) 婴幼儿

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

瘙痒、接触性皮炎、湿疹、汗疹、溃烂、皮炎、荨麻疹、蚊虫叮咬、冻疮

用法、用量

请每天数次, 取适量本品涂于患处

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
 - (2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用清水或者温水清洗。另外, 如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗
 - (3) 本品仅限外用
- 请勿在同一部位同时使用其他外用剂
 - 请勿在患部及其周围不洁净的情况下使用

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
利多卡因	2.0 g	(局部麻醉剂) 快速止痒
盐酸苯海拉明	2.0 g	(抗组胺剂) 抑制瘙痒的发生
异丙基甲基苯酚	0.1 g	(杀菌剂) 抑制杂菌
生育酚乙酸酯	0.3 g	(维生素 E) 促进新陈代谢, 加快患部康复

辅料: 单硬脂酸甘油酯、聚山梨酯 60、聚氧乙烯氢化蓖麻油、对羟基苯甲酸酯、硬脂醇、十六醇、丙二醇、羧乙烯基聚合物、癸二酸二乙酯、三乙醇胺

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后, 保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中 (可能造成误用或者变质)

- 大部分情况下, 阴囊瘙痒的原因并不是股癣
- 股癣大部分发生在大腿根内侧, 起小红疹, 呈同心圆状扩大, 伴发剧烈瘙痒
- 若使用 5~6 天后, 症状仍无好转, 有可能是股癣等。如疑似股癣, 请咨询医生、药剂师或注册经销商

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>