

## 第2類醫藥品

止癢消炎藥 **ムズメン**

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)  
請勿用於下列部位：眼睛及眼部周圍、黏膜等

## 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
- (3) 有藥物過敏史者
- (4) 有嚴重濕潤及潰瘍狀況者
- (5) 嬰幼兒

2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹

3. 使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

發癢、接觸性皮膚炎、濕疹、汗疹、潰瘍、皮膚炎、蕁麻疹、蟲咬、凍瘡

## 用法、用量

1 天數次，將本劑適量塗抹在患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本產品僅供外用
  - 相同部位請勿同時使用其他外用劑
  - 請勿在患部或其周圍仍是不潔的情況下使用

**成分、含量**

100g 中

成分	含量	作用
利多卡因	2.0 g	(局部麻醉劑) 快速止癢
鹽酸苯海拉明	2.0 g	(抗組織胺劑) 抑制發癢發生
異丙基甲基酚	0.1 g	(殺菌劑) 抑制病因雜菌的孳生
水楊酸乙二醇酯	0.3 g	(維他命 E) 促進新陳代謝，加快患部痊癒

添加物：甘油單硬脂酸酯、聚山梨醇酯 60、聚氧乙烯氫化蓖麻油、對羥基苯甲酸、硬脂醇、1-十六烷醇、丙二醇、羧乙烯聚合物、癸二酸二乙酯、三乙醇胺

**保管與使用相關注意事項**

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後，存放在乾燥、涼爽處，避免陽光直射
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

- 大部分情況下，陰囊發癢的原因並不是股癬
- 股癬大部分發生在大腿內側，起一些小紅疹，呈同心圓狀擴大，也可能伴隨強烈的搔癢感。
- 使用 5~6 天後，如果症狀仍無改善，有可能是股癬。如懷疑是股癬，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢。

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>