

第 2 類醫藥品

中藥製劑 ムズナイト

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 胃腸虛弱者
 - 曾因藥物等引起長疹子、發紅、發癢等症狀者
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	胃部有壓迫感
其他	全身倦怠、頭暈

- 若服用約 1 個月左右（如為改善小兒夜哭而服用則為 1 週左右）症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

以體力中等以上為基準，伴有神經亢奮明顯、易怒、煩躁等症狀者的以下諸症：神經症、失眠症、小兒夜哭、小兒疳症（神經過敏）、磨牙、更年期障礙、血道症^注

注）所謂「血道症」，是指伴隨月經、妊娠、分娩、產後、更年期等因女性荷爾蒙變動而產生的精神不安和焦躁等精神神經症狀以及身體症狀

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年 齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	1 包	一天 3 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

成分、含量

每天用量（3包:4.8g）中

含抑肝散加芍藥黃連萃取物 4.615g

當歸	2.75g	釣藤鈎	0.75g
----	-------	-----	-------

川芎	1.35g	白朮	2.65g
----	-------	----	-------

茯苓	3.25g	柴胡	1.0g
----	-------	----	------

甘草	0.3g	芍藥	2.0g
----	------	----	------

黃連	0.15g	（添加物：無水矽酸、糊精）	
----	-------	---------------	--

添加物：糊精、硬脂酸鎂

●由於本產品採用了天然產物（生藥），因此顆粒的顏色多少會有差異

保管與使用相關注意事項

- （1）請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- （2）請存放在幼兒拿不到的地方
- （3）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪府中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>