

第3類醫藥品

皮膚軟化藥 ニノキユア

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，並易引發副作用)

請勿用於以下部位

- (1) 眼部周圍、黏膜等部位
- (2) 刮傷等傷口、裂痕（龜裂）部位
- (3) 皮膚像瘡痂一般剝離的部位
- (4) 發炎部位（潰爛、紅腫處）

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 對藥物有過敏反應者

2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、刺激感(疼痛、發熱、麻痺感)、皮膚像瘡痂一般剝離的狀態

3. 若使用2週左右後症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

鯊皮斑、肘部、膝蓋・腳跟・腳踝的角化症、手指的粗糙、老人的乾皮症

用法、用量

請以適當的劑量每天擦拭患部數次。

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (4) 本產品僅供外用

- (5) 本品並非化妝品，因此請僅對功能與效果項中規定的患部使用，請勿當作基礎化妝品而使用於臉部

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
尿素	20.0g	除去變厚的角質，還您光滑皮膚
生育酚乙酸酯	0.5g	促進血液循環、增強皮膚新陳代謝
甘草酸單銨	0.5g	抑制皮膚發炎

添加物：聚山梨醇酯 60、聚氧乙烯氫化蓖麻油、甘油、丙二醇、對羥基苯甲酸酯、石蠟、液態石蠟、硬脂醇、鯨蠟醇、肉豆蔻酸異丙酯、卡波莫、角鯊烷、三乙醇胺

保管與使用相關注意事項

- (1) 請不要用沾有本劑的手觸碰眼睛和黏膜
- (2) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (3) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (4) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>