

## 第3类医药品

## 口腔咽喉药 のどぬ〜る ナイテクト

販売名： のどぬ〜る ナイテクト

## 使用注意事項

## 禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)  
请勿长期连续使用

## 咨询事项

- 下列人群请在使用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商
  - 正在接受医生或牙医治疗的人
  - 有药物过敏史的人
  - 有以下症状的人: 口腔严重溃烂
- 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	胃部不适、恶心

- 使用后可能会出现以下症状, 若该症状持续不止或加重时, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商:  
口腔的刺激感
- 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或注册销售商

## 功能、效果

咽喉炎引起的喉痛、喉肿、喉咙干燥、喉咙不适感、声音嘶哑, 口腔溃疡

## 用法、用量

请每天数次, 适量喷于患处

<用法与用量相关的注意事项>

- 存在咽喉炎症时, 请将喷嘴对准咽喉患处, 一边轻轻呼气一边喷射 (若在吸气的同时使用, 可能导致液体进入支气管和肺部)
- 幼儿使用时, 请在监护人的监督指导下使用
- 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用清水或温水清洗。此外, 症状严重时, 请接受眼科医生的诊疗
- 仅用于喷涂

(5) 因错误操作饮入大量药液时，请立即接受医生的诊疗

### 成分、含量

100mL 中

萘磺酸钠水合物 · · · · · 0.02 g

氯化十六烷吡啶单水合物 · · 0.3 g

辅料：丙二醇、羟丙甲纤维素、糖精钠、磷酸二氢钠、磷酸氢钠、乙醇、1-薄荷醇

### 保管及使用注意事项

(1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处

(2) 请将本品放在儿童接触不到的地方

(3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

- 使用后，请务必将喷嘴返回原始位置，并拧紧盖子进行保管
- 携带外出时，请将其装入附带的塑料袋中
- 使用过程中，药液喷溅会使衣物变色，请立即用水清洗
- 液体无法喷出时，请反复按下泵头，直至液体喷出为止。用针等物品戳喷嘴的尖端可能导致其折断，十分危险，请绝不要这么做。

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>