

第3类医药品

## 咽喉用杀菌消毒剂 のどぬ〜るスプレー

販売名： のどぬ〜るスプレーB

## 使用注意事項

## 禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

## 1. 下列人群请勿使用

- (1) 对本品或本品成分、碘（聚维酮碘）有过敏史的人
- (2) 患有甲状腺疾病的人
- (3) 未满2岁的婴幼儿
- (4) 孕妇或有可能妊娠的妇女
- (5) 处于哺乳期的妇女

## 2. 请勿长期连续使用

## 3. 请勿大量使用

## 咨询事项

## 1. 下列人群请在使用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生或牙医治疗的人
- (2) 有药物过敏史的人
- (3) 有以下症状的人: 口腔严重溃烂

## 2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
口部	皱裂、刺痛、烧灼感、刺激感
消化系统	恶心
其他	不适感

极少数患者会引发以下严重症状, 此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

## 3. 若使用5~6天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或注册销售商

## 功能、效果

咽喉的杀菌与消毒

## 用法、用量

请每天数次，适量喷于患处

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请将喷嘴对准咽喉患处，一边轻轻呼气一边喷射（若在吸气的同时使用，可能导致液体进入支气管和肺部）
- (2) 幼儿使用时需特别注意，请在监护人的监督指导下使用
- (3) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或温水清洗。此外，症状严重时，请接受眼科医生的诊疗
- (4) 请仅对咽喉使用
- (5) 因错误操作饮入大量药液时，请立即接受医生的诊疗

## 成分、含量

100mL 中

成分	含量	作用
碘	0.5g	咽喉的杀菌和消毒

辅料：碘化钾，甘油，丙二醇，D-山梨糖醇，乙醇，1-薄荷醇，香料

## 保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
  - 使用后，请务必将喷嘴返回原始位置，并拧紧盖子进行保管
  - 携带外出时，请将其装入附带的塑料袋中
  - 使用过程中，药液喷溅会使衣物变色，请立即用水清洗
  - 液体无法喷出时，请反复按下泵头，直至液体喷出为止。用针等物品戳喷嘴的尖端可能导致其折断，十分危险，请绝不要这么做。

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>