

## 第3類醫藥品

## 喉嚨用殺菌消毒劑 のどぬ〜るスプレー

販売名：のどぬ〜るスプレーB

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，當前的症狀會惡化，或者易引發副作用。)

## 1. 下列人士禁用

- (1) 對本劑或本劑成分、碘（聚維酮碘）曾有過敏反應者
- (2) 患有甲狀腺疾病者
- (3) 未滿2歲的嬰幼兒
- (4) 懷有身孕或有可能懷孕的婦女
- (5) 處於哺乳期的婦女

## 2. 請勿長期連續使用

## 3. 請勿大量噴塗

## 諮詢事項

## 1. 下列人士在使用前，請向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生或牙科醫生診療者
- (2) 曾對藥物過敏反應者
- (3) 有以下症狀者：口腔嚴重潰爛

## 2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
口部	皸裂、刺痛、燒灼感、刺激感
消化器官	噁心
其他	不適感

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能

若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
休克（過敏性）	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

## 3. 若使用5~6天後症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

喉嚨的殺菌與消毒

## 用法、用量

請以適當的量每天噴塗患部數次

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請將噴嘴對準喉嚨患部，一邊輕輕吐氣一邊噴塗（若在吸氣的同時使用，可能導致液體進入支氣管和肺部）
- (2) 幼兒使用時需特別注意，請在監護人的指導監督下使用。
- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (4) 僅適用於喉嚨
- (5) 不慎飲入大量藥液時，請立即接受醫生的診療

## 成分、含量

100mL 中

成分	含量	作用
碘	0.5g	喉嚨的殺菌和消毒

添加物：碘化鉀、甘油、丙二醇、D-山梨糖醇、乙醇、l-薄荷醇、香料

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請在蓋緊瓶蓋後直立存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- 使用後，請務必將噴嘴返回原始位置，並蓋好瓶蓋進行保管。
- 攜帶出門時，請將其裝入附帶的塑膠袋中
- 若使用藥物過程中導致衣物染色時，請立即用水清洗
- 液體無法噴出時，請反覆按下噴頭，直到液體噴出為止。另外，請勿使用針類物品穿刺噴嘴尖端

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>