

第3类医药品

口腔咽喉药 のどぬ〜るスプレー キッズ

販売名： のどぬ〜るスプレーキッズC

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用
 - (1) 对本品或本品成分、聚维酮碘（碘）有过敏史的人
 - (2) 患有甲状腺疾病的人
 - (3) 未满2岁的婴幼儿
2. 请勿长期连续使用
3. 请勿大量使用

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生或牙医治疗的人
 - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (3) 处于哺乳期的人
 - (4) 有药物过敏史的人
 - (5) 有以下症状的人: 口腔严重溃烂
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
口部	皴裂、刺痛、烧灼感、刺激感
消化系统	恶心
其他	不适感

极少数患者会引发以下严重症状, 此时请立即接受医生的诊疗

症状名称	症状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

3. 若使用5~6天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或注册销售商

功能、效果

咽喉炎引起的喉咙干燥、喉痛、喉肿、喉咙不适感、声音嘶哑

用法、用量

请每天数次，适量喷于喉咙的粘膜处

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请将喷嘴对准喉咙患部，一边轻轻呼气一边喷射（若在吸气的时候使用，可能会导致液体进入支气管及肺腔）
- (2) 幼儿使用时需特别注意，请在监护人的监督指导下使用
- (3) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或温水清洗。此外，症状严重时，请接受眼科医生的诊疗
- (4) 本品仅用于咽喉
- (5) 因错误操作饮入大量药液时，请立即接受医生的诊疗

成分、含量

100mL 中

聚维酮碘···0.45g

辅料：碘化钾、甘油、乙醇、柠檬酸、柠檬酸钠、薄荷醇、香料

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
 - (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
 - (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
 - (4) 请不要靠近火源（本品为含乙醇物质）
- 使用后，请务必将喷嘴返回原始位置，并拧紧盖子进行保管
 - 携带外出时，请将其装入附带的塑料袋中
 - 使用过程中，药液喷溅会使衣物变色，请立即用水清洗
 - 液体无法喷出时，请反复按下泵头，直至液体喷出为止。用针等物品戳喷嘴的尖端可能导致其折断，十分危险，请绝不要这么做。

严禁烟火

第二石油类 危险等级III

含乙醇物质 水溶性

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>

中国語（简体中文） 2018.12 作成

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。