

## 第3類醫藥品

## 口腔咽喉藥 のどぬ〜るスプレー キッズ

販売名：のどぬ〜るスプレーキッズC

## 使用注意事項

## 禁止事項

（若不遵守，當前的症狀會惡化，或者易引發副作用。）

1. 下列人士禁用
  - (1) 對本劑或本劑成分、聚維酮碘（碘）曾有過敏反應者
  - (2) 患有甲狀腺疾病者
  - (3) 未滿2歲的嬰幼兒
2. 請勿長期連續使用
3. 請勿大量噴塗

## 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生或牙醫治療者
  - (2) 孕婦或可能已經懷孕者
  - (3) 餵母乳中的人
  - (4) 曾對藥物過敏反應者
  - (5) 有以下症狀者：口內嚴重潰瘍
2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

| 相關部位 | 症狀            |
|------|---------------|
| 皮膚   | 長疹子和發紅、搔癢     |
| 口    | 乾裂、刺痛、灼熱感、刺激感 |
| 消化器官 | 噁心            |
| 其他   | 不適            |

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能

若有發生請立即接受醫生的診療

| 症狀名稱    | 症狀   |
|---------|--|
| 休克（過敏性） | 使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。 |

3. 若使用5~6天後症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

因喉嚨發炎引起的喉嚨乾裂、喉嚨痛、喉嚨腫脹、喉嚨不適、聲音沙啞

## 用法、用量

請每天數次適量噴於喉嚨的黏膜上

<用法與用量的注意事項>

- (1)請將噴嘴對準喉嚨患部，一邊輕輕吐氣一邊噴塗（若在吸氣的同時使用，可能導致液體進入支氣管和肺部）
- (2)幼兒使用時需特別注意，請在監護人的指導監督下使用。
- (3)請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (4)僅適用於喉嚨
- (5)不慎飲入大量藥液時，請立即接受醫生的診療

## 成分、含量

100mL 中

聚維酮碘 . . . 0.45g

內含作為添加物的碘化鉀、甘油、乙醇、檸檬酸、檸檬酸鈉、l-薄荷醇、香料

## 保管及使用注意事項

- (1)請在蓋緊瓶蓋後直立存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之
- (2)請存放在幼兒拿不到的地方
- (3)請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4)請避免接近火源（含有乙醇）
  - 使用後，請務必將噴嘴返回原始位置，並蓋好瓶蓋進行保管。
  - 攜帶出門時，請將其裝入附帶的塑膠袋中
  - 若使用藥物過程中導致衣物染色時，請立即用水清洗
  - 液體無法噴出時，請反覆按下噴頭，直到液體噴出為止。另外，請勿使用針類物品穿刺噴嘴尖端

## 嚴禁火源

第二石油類 危險等級Ⅲ

含乙醇物質 水溶性

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>