

第 3 类医药品

口腔咽喉药 のどぬ〜る 鎮痛ドロップ

販売名： のどぬーる a

使用注意事項

禁止事項

- (如不遵守，将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)
- 下列人群请勿使用
- (1) 曾因本药剂或本药剂的成分、苯甲酸酯引发过敏症状的人
 - (2) 被诊断为高铁血红蛋白血症的人

咨询事項

- 1. 下列人群请在使用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生或牙医治疗的人
 - (2) 有药物过敏史的人
- 2. 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
呼吸系统	恶心・呕吐
精神神经系统	嗜睡、不安、兴奋、眼花、眩晕
其他	浮肿、皮肤看起来发青、倦怠感、头痛

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克（过敏性反应）	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状
发抖、痉挛	

- 3. 若使用 5～6 天后症状仍无好转，请停止使用，并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或注册销售商

功能、效果

咽喉炎引起的喉痛、喉肿、声音嘶哑、喉咙干燥、喉咙不适感、口腔内的杀菌・消毒

用法、用量

成人（15 岁以上）
1 次 1 片，1 天 4-5 次，请勿咀嚼，在口中慢慢溶解
（未满 15 岁请勿服用）

- ＜用法与用量相关的注意事项＞
- (1) 请严格遵守规定的用法、用量
 - (2) 不要咀嚼或吞咽

成分、含量 5 片中

成分	含量
苯佐卡因	10mg
氯化十六烷吡啶单水合物	5mg
甘草酸二钾	12.5mg
萘磺酸钠水合物	4mg

辅料：异麦芽酮糖醇、甘油脂肪酸酯、安赛蜜钾、1-薄荷醇、dl-樟脑、香料

- ＜成分与含量的注意事项＞
- 服用本药剂后，感到舌头、嘴巴和喉咙发麻，但此为有效成分的作用，没有问题。
若服用后，感到舌头或喉咙发麻，请在吞咽饮料或食物时小心。

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 铝袋开封后，使用剩余的药剂要注意避光、防热、防潮，若已变质，请勿服用
- (5) 请勿使用过期产品

销售商：小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页：<https://www.kobayashi.co.jp>