

第3類醫藥品

口腔咽喉藥

のどぬ〜る 鎮痛ドロップ

販売名：のどぬーる a

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

下列人士請勿使用

- (1) 曾因本藥劑或其成分、苯甲酸酯而引發過敏症狀者
- (2) 被診斷出正鐵血紅蛋白血症者

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生或牙科醫生診療者
 - (2) 曾對藥物過敏反應者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	想吐、嘔吐
精神神經系統	嗜睡、焦慮、亢奮、視力模糊、眩暈
其他	水腫、皮膚看起來偏青、倦怠感、頭痛

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀
顫抖、痙攣	

3. 若使用 5~6 天後症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

因喉嚨發炎引起的喉嚨痛、喉嚨腫脹、聲音沙啞、喉嚨乾裂、喉嚨不適、口腔內的殺菌・消毒

用法、用量

成人（15 歲以上）

1 次 1 錠，1 天 4-5 次，請勿咀嚼，在口中慢慢溶解

（未滿 15 歲請勿服用）

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 請勿嚼碎或吞嚥

成分、含量

5 錠中

成分	含量
胺苯甲酸乙酯	10mg
氯化十六烷基吡啶水合物	5mg
甘草酸二鉀	12.5mg
呱侖酸鈉水合物	4mg

添加物：異麥芽酮糖醇、脂肪酸甘油酯、乙醯磺胺酸鉀、L-薄荷醇、dl-樟腦、香料

<成分與含量的注意事項>

服用本藥劑，可能感到舌頭、口腔或喉嚨發麻，但此為有效成分的作用，沒有問題。
若服用後，感到舌頭或喉嚨發麻，請在飲食吞嚥時要小心。

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 鋁袋開封後，使用剩餘的藥物應避光、防熱、防潮，若已變質，請勿服用
- (5) 超過使用期限的產品，請勿服用

銷售商：小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站：<https://www.kobayashi.co.jp>