

第3類醫藥品

喉嚨用殺菌消毒劑 のどぬ〜る

販売名：のどぬーるMa

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士禁用

- (1) 對本劑或本劑成分、碘（聚維酮碘）曾有過敏反應者
- (2) 有甲狀腺疾病的人
- (3) 未滿2歲的嬰幼兒

2. 請勿長期連續使用

3. 請勿大量使用

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生或牙科醫生診療者
- (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
- (3) 哺乳中的婦女
- (4) 有藥物過敏史者
- (5) 患部範圍大的人或有口內嚴重潰瘍者

2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
口部	乾裂、刺痛、灼熱感、刺激感
消化器官	想吐
其他	胸悶、不適

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能

若有發生請立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
休克（過敏性）	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

3. 若使用5~6天後症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

喉嚨的殺菌與消毒

用法、用量

取適切、適量本劑塗在患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 塗在喉嚨時，注意避免過量滲入到醫用棉上
- (2) 不慎飲入大量藥液時，請立即接受醫生的診療
- (3) 幼兒使用時需特別注意，請在監護人的指導監督下使用
- (4) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或者溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (5) 本品僅限喉嚨使用

成分、含量

100ml 中

成分	含量	作用
碘	1.0g	喉嚨的殺菌與消毒

添加物：碘化鉀、甘油、薄荷水、香料（苯酚）

<成分與含量的注意事項>

使用本劑可能使含有銀的牙齒材料（假牙等）變色

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊並直立存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
 - (2) 請保管在孩童拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- 如果使用中液體溢出附著到衣物上，請立即用水沖洗

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>