

第2类医药品

中药制剂 **ナリピタン 当帰芍薬散錠** (トウキシヤクヤクサンジョウ)

販売名: ナリピタン 当帰芍薬散錠

使用注意事項

咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 胃肠虚弱的人
 - 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、胃部不适

- 若服用约1个月后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

体力虚弱、畏寒症且因有贫血倾向而容易感到疲劳，有时会下腹疼痛、头重、晕眩、肩酸、耳鸣、心悸等症状的以下各种病症：月经不调、月经异常、痛经、更年期障碍、产前产后或因流产引起的不适（贫血、疲劳倦怠、晕眩、浮肿）、晕眩及站立性头晕、头重、肩酸、腰痛、腰腿发冷、冻疮、浮肿、斑点、耳鸣

用法、用量

请按照以下剂量，于餐间以水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15岁以上）	4片	1天3次
7岁以上未满15岁	3片	
5岁以上未满7岁	2片	
不满5岁	× 不可服用	

<用法用量相关的注意事项>

- 请严格遵守规定的用法与用量
- 幼儿应在监护人的监督指导下服用
- 本品易受潮，因此每次服用后请务必盖紧瓶盖

●餐间是指“两餐之间”，即餐后约2~3个小时

成分、含量

每日用量（12片）中 含当归芍药散提取物(1/2量) 2.30 g
 <中草药换算量>

当归····· 1.5 g	川芎····· 1.5 g
芍药····· 2.0 g	茯苓····· 2.0 g
苍术····· 2.0 g	泽泻····· 2.0 g

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、硬脂酸镁、乳糖

●本品采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本品
- (5) 瓶中填充物用于防止药剂在运送时受损，开封时请丢弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>