

第3类医药品

皮肤软化药 **ネルワキュア**

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

请勿对以下部位使用

- (1) 眼部周围、粘膜等部位
- (2) 刮伤等伤口、裂缝(龟裂)部位
- (3) 像疮痂一般被剥离的皮肤部位
- (4) 炎症部位(疮疡、红肿部位)

咨询事项

1. 下列人群请在使用前向医生、药剂师或注册经销商咨询
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 有药物过敏史的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒、刺激感(疼痛、发热、麻痹感)、皮肤像疮痂一般被剥离的状态

3. 使用2周左右后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

手指粗糙、肘部、膝盖、脚后跟、脚踝的角化症、老人的干皮症、鲨皮斑

用法、用量

1天几次, 取适量涂抹于患处

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请严格遵守用法与用量。
- (2) 请注意不要溅入眼睛。万一溅入眼睛时, 请立即用水或温水清洗。此外, 症状较严重时, 请接受眼科医生的诊疗。
- (3) 幼儿使用时, 请在成人的监护下使用。
- (4) 本品仅供外用。

- (5) 本品并非化妆品，因此请仅对功能和效果项中规定的患部使用，不要作为基础化妆品等对面部使用。

成分、含量

100g 中

成分	含量
尿素	20.0g
生育酚乙酸酯	2.0g
甘草酸单铵	0.5g

辅料：角鲨烷、肉豆蔻酸异丙酯、花生醇聚醚-20、硬脂醇、甘油、丙二醇、液体石蜡、凡士林、山嵛醇、白蜂蜡、硬脂酸、十六十八醇、聚山梨醇酯 60、山梨醇硬脂酸酯、水杨酸、二甲聚硅氧烷、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、黄原胶、对羟基苯甲酸酯、依地酸二钠、三乙醇胺

保管及使用注意事项

- (1) 请不要用沾有本剂的手触碰眼睛和粘膜。
- (2) 请在密闭瓶盖后保管在避免阳光直射的阴凉地方。
- (3) 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- (4) 请勿换装到其他容器中。（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>