

## 第2类医药品

便秘药 **オイルデル**

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

服用本品期间, 请勿服用下列药品

其他腹泻药 (泻药)

## 咨询事项

1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
- (3) 有下列症状的人

剧烈腹痛、恶心・呕吐。

2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
消化系统	剧烈腹痛、恶心・呕吐

3. 服用后有可能出现下列症状, 若该症状持续或加重, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商: 腹泻

4. 若服用1周左右后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

○便秘

○缓解便秘伴发的下列症状:

头重、上火、皮肤粗糙、疙瘩、食欲不振(食欲减退)、腹部胀满、肠内异常发酵、痔疮

## 用法、用量

请按以下剂量, 早晚空腹以水或温水送服

需注意的是, 第一次请服用最小量, 根据通便情况逐渐增减药量

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15岁以上)	3~4粒胶囊	2次
未满15岁	× 不可服用	

<用法、用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

- 空腹时：尽量在餐后 2 小时以上

### 成分、含量

8 粒胶囊中

琥珀辛酯磺酸钠 200 mg 麻子仁末 1000 mg

辅料：甘油脂肪酸酯、白蜂蜡、丙二醇脂肪酸酯、中链脂肪酸三酰甘油、琥珀酸明胶、甘油、对羟基苯甲酸酯、氧化钛、黄色 5 号

- 本品使用了天然物（中草药），因此胶囊的颜色会有少许差异

### 保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>