

第2類醫藥品

便秘藥 **オイルデル**

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)
 在服用本劑期間，請勿服用以下藥品
 其他腹瀉劑（瀉藥）

諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
- (3) 有下列症狀者

劇烈腹痛，想吐、嘔吐

2. 服用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
消化器官	劇烈腹痛、想吐・嘔吐

3. 服用後可能會出現以下症狀，若該症狀持續不止或增強時，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢：腹瀉

4. 若服用1週左右後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

○便秘

○緩和伴隨便秘來而的以下症狀

頭重、灼熱感、皮膚粗糙、痘痘、食欲不振（食欲減退）、腹部脹、腸內異常發酵、痔瘡

用法、用量

用水或溫水早晚空腹服用、用量如下

但是，第一次請服用最小量，再根據通便情況增量或減量

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	3~4顆膠囊	2次
未滿15歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 空腹時：盡量於餐後 2 小時以上

成分、含量

8 膠囊中

磺琥辛酯鈉 200 mg 麻子仁末 1000 mg

添加物：甘油脂肪酸酯、白蜂蠟、丙二醇脂肪酸酯、中鏈脂肪酸三酸甘油酯、琥珀醯明膠、甘油、對羥基苯甲酸酯、氧化鈦、黃色 5 號。

- 由於本劑使用了天然藥物（生藥），膠囊的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥、涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>