

## 第②类医药品

痔疮外用药 **オシリア**

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用: 患部化脓的人
2. 请勿长期连续使用

## 咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - (3) 有药物过敏史的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀
其他	刺激感、化脓

3. 若使用 10 天左右后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

缓解痔裂或痔核导致的疼痛、瘙痒、肿胀、出血, 并消毒

## 用法、用量

取适量本品, 涂抹于肛门部位。此外, 1 天最多可使用 3 次

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 幼儿应在监护人的监督指导下使用
- (3) 本品仅限肛门部位使用

**成分、含量**

100g 中

成分	含量
醋酸氢化可的松	0.5g
盐酸苯海拉明	1 g
利多卡因	3 g
异丙基甲基苯酚	0.1g
醋酸生育酚酯	3 g

辅料：凡士林、芳烴凝胶、微晶蜡、山嵛醇、白蜂蜡、羊毛脂醇、丙二醇、肉豆蔻酸异丙酯、BHT、聚山梨酯 80、失水山梨糖醇单油酸酯

**保管及使用注意事项**

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿装入其他容器中。（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>