

第②類醫藥品

痔瘡外用藥 **オシリア**

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士請勿使用：患部化膿的人
2. 請勿長期連續使用

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 對藥物曾有過敏反應者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹
其他	刺激感、化膿

3. 若使用 10 天左右以後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

肛裂、痔核導致的疼痛、發癢、腫脹、出血的緩和及消毒

用法、用量

取適量本劑，塗抹在肛門部。另外，1 天最多可以使用 3 次

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (3) 本品僅限肛門部使用

成分、含量

100g 中

成分	含量
醋酸氫腎上腺皮質素	0.5g
鹽酸苯海拉明	1 g
利多卡因	3 g
異丙基甲基酚	0.1g
醋酸鹽維生素 E	3 g

添加物：凡士林、凝膠化烴、微晶蠟、山喻醇、白蜂蠟、羊毛脂、丙二醇、肉豆蔻酸異丙酯、BHT、聚山梨醇酯 80、山梨坦倍半油酸酯。

保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>