

第3类医药品

## 止痒消炎药 ラナケイン S

販売名：ラナケイン S

## 使用注意事項

## 禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

请勿用于下列部位: 眼睛周围、粘膜等

## 咨询事項

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 有药物等过敏史的人
- (3) 患部不干爽及溃烂严重的人
- (4) 婴幼儿

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

瘙痒、接触性皮炎、湿疹、蚊虫叮咬、皮炎、荨麻疹、汗疹、溃烂、冻疮

## 用法、用量

请每天数次, 取适量本品涂于患处

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗
- (3) 本品仅限外用
- (4) 请勿在同一部位同时使用其他外用剂
- (5) 请勿在患部及其周围不洁净的情况下使用

**成分、含量**

100g 中

成分	含量
苯佐卡因	5.0 g
盐酸苯海拉明	2.0 g
异丙基甲基苯酚	0.1 g

辅料：石蜡油、羊毛脂醇、山嵛醇、肉豆蔻酸异丙酯、聚氧乙烯硬脂基醚、聚氧乙烯鲸蜡醚、对羟基苯甲酸酯、硬脂酸甘油酯、硬脂酸聚乙二醇酯、二甲聚硅氧烷、依地酸钠、甘油、亚硫酸钠及香料

**保管及使用注意事项**

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处  
(尤其要避免放在取暖器具旁，或夏季的汽车内等极端高温处)
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿靠近火源

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>