

第2类医药品

止痒消炎药 ラナケイン冷感ジェル

販売名：ラナケイン G

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

请勿用于下列部位: 眼睛周围、粘膜等

咨询事項

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 有药物过敏史的人
- (3) 患部不干爽及溃烂严重的人
- (4) 婴幼儿

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

| 相关部位 | 症状 |
|------|-------------|
| 皮肤 | 皮疹与发红、瘙痒、肿胀 |

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

瘙痒、接触性皮炎、湿疹、蚊虫叮咬、皮炎、荨麻疹、汗疹、溃烂、冻疮

用法、用量

请每天数次, 取适量本品涂抹于患处

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗
- (3) 本品仅限外用
- (4) 请勿在同一部位同时使用其他外用药剂
- (5) 请勿在患部及其周围不洁净的情况下使用

成分、含量

100g 中

| 成分 | 含量 | 作用 |
|-------|------|----------------------------|
| 苯海拉明 | 1.0g | (抗组织胺剂) 抑制瘙痒 |
| 利多卡因 | 2.0g | (局部麻醉剂) 麻痹感觉神经, 缓解瘙痒症状 |
| 1-薄荷醇 | 4.0g | (冷感刺激剂) 通过冷感麻痹感觉神经, 缓解瘙痒症状 |

辅料: 尿素、羧乙烯基聚合物、丙二醇、BHT、乙醇、磷酸

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后, 保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请不要换装到其他容器中 (可能造成误用或者变质)
- (4) 请勿靠近火源 (乙醇含有物)

可燃固体 危险等级 III 含乙醇物质

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>